

Agronomске особине голозрног јечма у поређењу са пљевићастим

- Originalan naučni rad -

Dejan DODIG¹, Saša STANKOVIĆ², Miroslava JOVIĆ², Bojana DIMITRIJEVIĆ³
i Gordana BRANKOVIĆ³

¹Institut za kukuruz "Zemun Polje", Beograd-Zemun

²Centar za poljoprivredna i tehnološka istraživanaja, Zaječar

³Institut za ratarstvo, Poljoprivredni fakultet, Beograd

Izvod: Poslednjih desetak godina u svetu raste interes za upotrebom golozrnog ječma u direktnoj ljudskoj ishrani i industrijskoj preradi. Razlog za to je pre svega što golozrni ječam predstavlja bogat izvor rastvorljivih biljnih vlakana i da nije potrebno mehanički odvajati plevice. U Srbiji ne postoji tradicija gajenja ovog varijeteta ječma zbog čega su u domaćim institutima devedesetih godina prošlog veka zasnovani programi oplemenjivanja golozrnog ječma. Introdukovana je i testirana germplazma iz Azije, Afrike i Amerike, izvršena su ukrštanja i stvorene prve linije i sorte golozrnog ječma. U radu su prikazane neke agronomске особине линија голозрног јечма проеклом из Међunarodnog Центра за полјопривредна истраживања у сујним реонима (ICARDA), Сирија, и новостворених линија голозрног јечма у поређењу са сортама пљевићастог јечма у агроколошким условима источне Србије.

Ključне речи: Agronomске особине, голозрни јечам, озима и јара сетва, пљевићasti јечам, прinos.

Uvod

Јечам (*Horedium vulgare* L.) је по знаčају четврта жitarica u svetu posle pirinča, пšenice i kukuruza, и углавном се користи као сточна храна или се прерадује у pivski slad. Poslednjih godina јечам се све више користи и у исхрану људи као одличан извор rastvorljivih biljnih vlakana, што му је дaje статус zdravstveno korisne biljke i место u proizvodnji tzv. funkcionalne hrane, **Brennan** i **Cleary**, 2005. U tom pogledу голозрни јечам (*Horedium vulgare* var. *nudum*) има низ предности у односу на пљевићасте forme јечма, **Bhatty**, 1999.

Kod голозрног јечма пlevice nisu čvrto srasle za zrno te se mogu odstraniti bez mehaničkog uklanjanja odnosno ljuštenja. S gajenjem ovog varijeteta počelo se nekih 1500 godina posle plevičastog јечма, *Zohary i Hopf*, 1993. Smatra se da najverovatnije vodi poreklo iz jugo-zapadnog Irana, *Taketa i sar.*, 2004. Tradicionlno je gajen samo u istočnoj Aziji u planinskim predelima Nepala i Tibeta, Kini, Koreji i južnom Japanu, *Takahashi*, 1955. U Evropi se najviše gaji u oblasti Alpa, Belgiji, Norveškoj, Nemačkoj i Češkoj, *Barabaschi i sar.*, 2007. U novije vreme najveća ekspanzija pod ovom kulturom je zabeležena u Kanadi, gde se uglavnom koristi kao visoko kvalitetna hrana za svinje, *Bhatty*, 1999.

Brojni autori navode da golozrni јечам ima niže prinose u odnosu na plevičasti јечam, što može biti razlog zašto se ovaj varijetet sporo širi u proizvodnji. U zemljama gde se golozrni јечam najviše gaji dominiraju sorte dvorede forme klase zbog ispunjenog i valjkastog zrna, belog aleurona i mekog endosperma, što im daje više prednosti u industrijskoj preradi i upotrebi za ljudsku ishranu, *Bhatty*, 1999. Postoje sorte голозрног јечма sa niskim (0-10%) i visokim (> 35%) sadržajem amiloze u skrobu, *Washington i sar.*, 2000, kao i sorte sa niskim (4-6%) i visokim (6-8%) sadržajem β-glukana u zrnu, *Fastnaught i sar.*, 1996. Pokazalo se da je sadržaj amiloze u negativnoj korelaciji sa sadržajem β-glukana, *Hang i sar.*, 2007.

U Srbiji ne postoji tradicija gajenja голозрног јечма zbog čega je devedesetih godina prošlog veka u Institutu u Novom Sadu, *Pržulj i sar.*, 1996, a kasnije i u drugim institutima u zemlji (Zaječar), zasnovan program oplemenjivanja голозрног јечма. Prvi rezultati su ukazali na mogućnost selekcije sorti голозрног јечма koje će imati povoljne agronomске i tehnološke osobine u našim agroekološkim uslovima, *Pržulj i sar.*, 2000. Do sada su u Srbiji priznate dve domaće sorte голозрног јечма (Golijat i Baša).

Cilj ovog rada je da se prikažu neke agronomске osobine introdukovanih i novostvorenih linija голозрног јечма u poređenju sa domaćim sortama plevičastog јечма u agroekološkim uslovima istočne Srbije.

Materijal i metode

Ogledi sa ozimim i jarim голозрним јечмом izvedeni su u toku sedam sezona (2000-2006) na oglednom polju Centra za poljoprivredna i tehnološka istraživanja u Zaječaru. U ozimoj setvi tokom tri sezone je ispitivan set голозрних genotipova pod nazivom *International Winter and Facultative Hulless Barley Observation Nursery 1996-97* (IWFHBON97), njih ukupno 20 (n = 20). U jaroj setvi u toku pet sezona bio je ispitivan set голозрних genotipova pod nazivom *Naked Barley Observation Nursery 1996-97* (NBON97) (n = 13) i linije голозрног јечма (n = 7) koje su stvorene iz ukrštanja domaćih plevičastih sorti јечма i genotipova iz Sirije (IWHBON 97 i NBON97). Navedene kolekcije genotipova голозрног јечма iz Sirije nastale su u programu unapređenja germplazme žitarica Međunarodnog centra za istraživanja u sušnim oblastima (ICARDA, 1998).

Radi upoređenja u ogledima su bile zastupljene i domaće sorte plevičastog

јечма, и то: озими dvoredi јечам (Kristal, Krajinac, Jagodinac, NS 293 i NS 525) и ozimi šestoredi јечам (NS-313, Galeb i linija ZA-121) u ogledima sa IWFHBON97, odnosno jari dvoredi јечам (Zlatan, Zaječarski 31 i Jelen) i jari šestoredi јечам (Timočanin) u ogledima sa NBON97 i novostvorenim голозрним линijama. Основни подаци о наведеним домаћим sortama (kad i где су селекционисане) могу se naći na web adresi www.sorte.minpolj.sr.gov.yu.

Ogledi su sejani u tri ponavljanja po kompletном блок систему, sa veličinom основне parcelice od $5m^2$. U izvođenju ogleda применена je standardna agrotehnika за производњу озимог i jarog јечма.

Analizirane su sledeće osobine: ranostasnost (израžена као број дана од 1. јануара до класања), маса 1000 зрна, hektolitarska маса зрна, прнос, проценат голих зрна у маси и садржај протеина у зрну. У погледу резултата приказан је просек особина свих генотипова у оквиру pojedinih grupa (dvoredi i šestoredi голозрни јечам односно dvoredi i šestoredi plevičasti јечам) као и опсег вариранja особине у оквиру сваке групе. Тестирање значајности разлика средnjih вредности особина између dvoredih голозрних i plevičastih јечмова, односно шестoredih голозрних i plevičastih јечмова, izvršeno je t-testom.

Резултати i дискусија

Ozima setva. - U ogledu sa IWHBON97 bilo je zastupljeno 12 genotipova sa dvoredim tipom klase i osam genotipova sa šestoredim tipom klase (*Hordeum vulgare* ssp. *distichon* var. *nudum*) i osam genotipova sa šestoredim tipom klase (*Hordeum vulgare* ssp. *vulgare* var. *coeleste*). Prosečne vrednosti испитивних особина ових генотипова i опсег вариранja u toku tri godine prikazani su u Tabeli 1 u poređenju sa ozimim plevičastim dvoredim i šestoredim sortama.

Dvoredi генотипови голозрног јечма u просеку su имали за четири дана дужу, a шестoredi, за три дана краћу vegetацију od odgovarajućih plevičastih kontrolnih sorti. Iako ova razlika nije statistički значајна, испитивана germplazma ozimog голозрног јечма poseduje veliku варијабилност u pogledu дужине vegetacije što predstavlja добру основу за оплеменjivanje голозрног јечма за ovu особину. Pojedine године u toku испитivanja, као што су 2000. ili 2002., bile su izrazito сушне u toku пролећног dela vegetacije. S обзиром на чест deficit vlage u fazi nalivanja зрна u našim agroekološkim uslovima скраћивање vegetacije je jedan od prioritetnih ciljeva u većini оплеменjivačkih programa strnih žita u Srbiji. U tom smislu posebno su интересантни за укњижење pojedini генотипови шестoredog голозрног јечма sa 9-11 дана краћом vegetacijom u odnosu na ostale испитиване генотипове i sorte.

Очекивано маса 1000 зрна plevičastih јечмова je bila veća u odnosu na голозрне јечmove, kao i dvoredih u odnosu na шестoredе јечmove. Генотипови dvoredog i šestoredog голозрног јечма имали су за 7,4% ($P>0,05$) односно 11,2% ($P<0,05$) manju masu 1000 зрна u odnosu na plevičaste dvorede odnosno шестoredе генотипове, по redosledu. Na razliku u težini зрна između ova dva varijeteta јечма u najvećoj meri utiče odsustvo plevica kod голозрног јечма. Испитивани шестoredi

Tabela 1. Broj dana do klasanja, masa 1000 zrna, hektolitarska masa i prinos ozimih goloznih (IWHBON97) i plevičastih ječmova (2000-2002)(n=broj genotipova)

Number of Days to Heading 1000-grain weight, Hectolitar Weight and Yield of Winter Naked (IWHBON97) and Hulled Barley (2000-2002) (n=number of genotypes)

Tip ječma Barley type	Tip klasa Spike type	Broj dana do klasanja No. of days to heading	Masa 1000 zrna (g) 1000 grain weight	Hektolitars ka masa (kg/hl) Hectoliter weight	Prinos (t/ha) Yield
IWHBON97 (n = 12)	2-ređi 2-rowed	123 (117-127)	41,9 (36,7-45,8)	79,5* (76,3-81,5)	4,32 (3,32-5,30)
Plevičasti/ Hulled (n = 5)	2-ređi 2-rowed	119 (116-122)	45,2 (41,8-48,2)	73,2 (69,4-76,9)	6,15* (5,48-6,80)
IWHBON97 (n = 8)	6-ređi 6-rowed	120 (107-124)	35,9 (31,8-41,6)	76,2* (73,4-79,8)	3,77 (2,89-4,42)
Plevičasti/ Hulled (n = 3)	6-ređi 6-rowed	123 (118-126)	40,4* (38,2-44,0)	70,7 (67,6-73,4)	5,67* (4,73-5,91)

* značajno na nivou 0,05 - significant at the 0.05 probability level

genotipovi imaju prilično sitno zrno, za šest grama lakše od dvoredih goloznih ječmova. Upravo zbog krupnijeg i ispunjenijeg zrna proizodači u svetu više prihvataju golozne ječmove dvorede forme klasa.

Golozne forme ječma imale su za oko 8% veću hektolitarsku masu od plevičastih ječmova, što je statistički značajna razlika ($P<0,05$). Do sličnih rezultata su došli i drugi autori, *Pržulj i sar.*, 2000, *Choo i sar.*, 2001. Kod golozrnog ječma hektolitarska masa najviše zavisi od stepena odvajanja plevica, odnosno procenta golih zrna. Genotipovi sa većim procentom zrna sa plevicom po pravilu imaju manju hektolitarsku masu. Testirani dvoredi golozni genotipovi u proseku su imali odličnu hektolitarsku masu zrna (79,5 kg/hl) te i po ovom fizičkom parametru zrna nadmašuju šestoredi golozne forme (76,2 kg/hl).

Prosečan prinos dvoredih i šestoredih genotipova golozrnog ječma bio je statistički značajno niži ($P<0,05$) u odnosu na dvorede i šestoredne sorte plevičastog ječma. Procentualno sniženje prinosa kod dvoredih formi iznosilo je 29,8% a kod šestoredih 33,6%. Ispitanja u Kanadi su pokazala da je prinos goloznih ječmova bio za 21-36% niži u odnosu na plevičaste, *Choo i sar.*, 2001. I drugi autori navode niže prinose golozrnog ječma u odnosu na plevičasti, *McGuire i Hockett*, 1981, *Hang i sar.*, 2007.

U sezoni 2002-03 dolazi do potpunog izmrzavanja svih genotipova iz IWHBON97, koji su po tipu ozimi i fakultativni ječmovi, usled poljske golomrazice pri temperaturi od -15°C . S druge strane procenat izmrzlih biljaka domaćih plevičastih sorti u ogledu kretao se od 5 do 30%. Stoga jedan od razloga značajno nižeg prinosa ispitivanog golozrnog ječma u odnosu na plevičasti ječam u ozimoj setvi treba tražiti u slabijoj otpornosti na niske temperature, što se može tumačiti

činjenicom da su ovi golozrni genotipovi selekcionisani za drugačije agroekološke uslove proizvodnje.

Jara setva. - U toku 2000. i 2001. godine testirano je ukupno 19 jarih golozrnih genotipova iz seta NBON97 (svi šestoredog tipa klase). Na osnovu prinosa i drugih agronomskih svojstava (podaci nisu prikazani) za dalje ispitivanje odabранo je 13 genotipova. Njima je pridodata još 7 linija dvoredog golozrnog ječma nastalih iz ukrštanja golozrnih genotipova (IWHBON97 i NBON97) sa domaćim plevičastim sortama. Dobijeni rezultati prikazani su u Tabeli 2 u poređenju sa jarim plevičastim dvoredim i šestoredim sortama.

Tabela 2. Broj dana do klasanja, masa 1000 zrna, hektolitarska masa i prinos ozimih goloznih (IWHBON97) i plevičastih ječmova (2002-2005)(n=broj genotipova)
Number of Days to Heading 1000-grain weight, Hectolitar Weight and Yield of Winter Naked (IWHBON97) and Hulled Barley (2002-2005) (n=number of genotypes)

Tip ječma Barley type	Tip klasa Spike type	Broj dana do klasanja No. of days to heading	Masa 1000 zrna (g) 1000 grain weight	Hektolitars ka masa (kg/hl) Hectoliter weight	Prinos (t/ha) Yield
Golozrni/ Naked (n = 7)	2-reddi 2-rowed	147 (144-151)	41,2 (37,3-44,6)	76,5* (73,3-79,7)	3,41 (2,88-4,14)
Plevičasti/ Hulled (n = 3)	2-reddi 2-rowed	143 (140-145)	47,1* (38,8-49,2)	68,1 (66,4-69,5)	3,89 (3,66-4,20)
NBON97 (n = 13)	6-reddi 6-rowed	144 (138-148)	37,1 (34,9-39,7)	70,7* (66,9-73,7)	2,74 (2,07-3,48)
Plevičasti/ Hulled (n = 1)	6-reddi 6-rowed	149 -	40,6 -	64,5 -	3,08 -

* značajno na nivou 0,05 - significant at the 0.05 probability level

Kao i u ozimoj setvi dvoredi golozrni ječmovi imali su dužu vegetaciju (za četiri dana), a šestoredi kraću (za pet dana), od kontrolnih plevičastih sorti. Najveću varijabilnost u pogledu dužine vegetacije opet su ispoljili šestoredi golozrni ječmovi. S obzirom na manji prinos i lošije karakteristike zrna u odnosu na dvorede golozrne forme ove linije mogu pre svega poslužiti za ukrštanja radi dobijanja ranostasnijih dvoredih golozrnih genotipova.

Jari dvoredi golozrni genotipovi imali su za 5,9 grama ili 12,6% manju masu 1000 zrna od dvoredih plevičastih ječmova, što je statistički značajna razlika ($P<0,05$). Manja masa zrna šestoredih golozrnih genotipova u odnosu na Timočanin za 4,9 grama ili 8,6% statistički nije značajna. I dvoredi i šestoredi golozrni ječamovi imali su u proseku značajno veću hektolitarsku masu zrna ($P<0,05$) u odnosu na plevičaste forme.

Iako su golozrni dvoredi i šestoredi genotipovi imali za 12,4% i 11,1% niži

прнос у односу пљивчасте контроле, та разлика nije била статистички значајна. Пожеднији дvoredi голозрни генотипови су по прносу скоро потпуно били једнаки са домаћим пљивчастим сортама, док су неки шестореди голозрни јечмови по прносу надмашили Тимоћанин.

Као што је већ раније напоменуто у литератури се углавном navodi нижи прнос голозрног јечма у односу на пљивчасти јечам, што се објашњава губитком тежине услед одвјања пlevica. Међутим **Choo i sar.**, 2001, navode да када би се прнос голозрног јечма кориговао за тежину пlevica он би још увек био нижи у односу на пљивчасти јечам. То указује да разлику у прносу између ова два варијетета јечма усlovjavaju и други фактори. **Pržulj i sar.**, 2000, ističу да нижи прносови линија голозрног јечма у односу на пљивчасте домаће sorte не могу бити препрека даљем раду на овој форми јечма јер су испитивања ukazala на могућност селекције сорт голозрног јечма које ће у агроеколошким условима Србије имати поволjnе agronomске i tehnološke особине.

Procenat golih zrna i sadržaj proteina u zrnu. - Поред високог прноса један од главних циљева у оплеменjivanju голозрног јечма је потпунa odsutnost zrna sa plevicom. Наime генотипови голозрног јечма у већем или мањем проценту могу имати зrna od коjih se plevica nije odvojila nakon vršidbe. Smatra se da dobre sorte голозрног јечма треба да имају преко 95% golih zrna u masi. Испитивани генотипови су имали од 85-100% golih zrna u masi. На доњој граници су биле новостворене линије из уkrštanja са домаћим пљивчастим сортама a 100% golih zrna u masi имали су pojedini генотипови јарог dvoredog јечма. Generalno, испитивани голозрни генотипови јечма имали су од 85-100% golih zrna u masi. Ozimi dvoredi i шестореди голозрни јечмови имали су од 90-95% golih zrna u masi, dok se kod jarih шесторедих голозрних јечмова проценат golih zrna u masi kretao od 95-100. Najniži sadržaj golih zrna (85-90%) imale su novostvorene линије јарог dvoredog јечма из ukrštanja са домаћим пљивчастим сортама.

Komparativni podaci o hemijskom sastavu zrna ukazuju da generalno голозрни јечам има већи sadržaj proteina od пљивчастог јечма, **Oscarsson i sar.**, 1996. Veći sadržaj proteina u zrnu kod голозрног u односу на пљивчастi јечам može biti posledica odsustva plevica i/ili rezultat оплеменjivanja na povećan sadržaj proteina u zrnu, **Li i sar.**, 2003. U našim istraživanjima sadržaj proteina u ozimoj setvi kod голозрног јечма kretao se u proseku od 13,2 (dvoredi) do 17,8% (шестореди) a kod пљивчастог od 10,8 (dvoredi) do 14,5% (шестореди). U јарој setvi голозрни јечам je имао u proseku od 13,8 (dvoredi) do 16,8% (шестореди) a пљивasti od 11,6 (dvoredi) do 14,1% (шестореди) proteina u zrnu. Dakle, шестореди голозрни генотипови су имали veći sadržaj proteina od dvoredih голозрних генотипова i u ozimoj i u јарој setvi.

Pre upotrebe u ishrani ljudi i nepreživara kod пљивчастог јечма мајински se mora odstraniti plevica. Оsim što iziskuje dodatni utrošak energije, prilikom ljuštenja plevica gubi se i deo aleuronског sloja, zbog čega je smanjen sadržaj proteina u finalnim proizvodima. Napred navedeno ukazuje da u односу на пљивчастi јечам голозрни има više предnosti u procesu prerade i upotrebe, što i поред nižih прноса opravdava njegovo гајење на većim površinama.

Zaključak

Ispitivani genotipovi golozrnog ječma imali su veću hektolitarsku masu zrna i sadržaj proteina u zrnu, a manji prinos i masu 1000 zrna u odnosu na domaće plevičaste sorte ječma. U ozimoj setvi golozrni ječam je imao značajno niži prinos od plevičastog ječma, a jedan od razloga za to može biti slabija otpornost na niske temperature odnosno sposobnost prezimljavanja. Jari genotipovi golozrnog ječma pokazali su bolju adaptiranost na naše agroekološke uslove od ozimih. Ovi ječmovi po prinosu ne zaostaju značajno za domaćim plevičastim sortama ječma, a premašuju ih po sadržaju proteina.

Da bi se povećao interes za гајењем голозрног јечма у Србији неопходно је створити sorte које су по прносу и агрономским својствима ravne ili barem približne domaćim plevičastim sortama. У том смислу даље унапређење постојећих genotipova голозрног јечма могуће је постиći укрштањем са домaćим и страним sortama plevičastog ječma. Zbog većeg prinosa као и krupnijeg i ispunjenijeg zrna, prednost u оplemenjivanju i гајењу голозрног јечма у нашој земљи треба dati dvoredim u odnosu na šestoredne forme.

Literatura

- Barabaschi, D., L. Campani, E. Francia, H. Toubia-Rahme, G.P. Vale, A. Gianinetti, G. Delogu, A.M. Stanca and N. Pecchioni** (2007): Halotype structure around *nud* locus in barley and its association with resistance to leaf stripe. Plant Breeding 126: 24-29.
- Bhatty, R.S.** (1999): The potential of hull-less barley. Cereal Chem. 76: 589-599.
- Brennan, C.S. and L.J. Cleary** (2005): The potential use of cereal (1→3) (1→4)-beta-D-glucans as functional food ingredients. J. Cereal Sci. 42: 1-13.
- Choo, T.-M., K.M. Ho and R.A. Martin** (2001): Genetic analysis of a hulless x covered cross of barley using doubled-haploid lines. Crop Sci. 41:1021-1026.
- Fastnaught, C.E., P.T. Berglund, E.T. Holm and G.J. Fox** (1996): Genetic and environmental variation in β-glucan content and quality parameters of barley for food. Crop Sci. 36: 941-946.
- Hang, A., D. Obert, A.I.N. Gironella and C.S. Buron** (2007): Barley amylose and β-glucan: their relationships to protein, agronomic traits, and environmental factors. Crop Sci. 47: 1754-1760.
- ICARDA** (1998): ICARDA Germplasm Program: Cereals Annual Report for 1997, ed. International Centre for Agricultural Research in the Dry Areas, Aleppo, Syria.
- Li, J.H., T. Vasanthan, R. Hoover and B. Rossnagel** (2003): Starch from hull-less barley: I. Granule morphology, composition and amylopectin structure. Food Chem. 74: 395-405.

- McGuire, C.F. and E.A. Hockett** (1981): Effect of awn length and naked caryopsis on malting quality of Betzes barley. *Crop Sci.* 21: 18-21.
- Oscarsson, M., R. Anderson, A.C. Salomonsson** and **P. Aman** (1996): Chemical composition of barley samples focusing on dietary fibre components. *J. Cereal Sci.* 24: 161-170.
- Pržulj, N., S. Denčić, V. Momčilović i M. Kovačev-Đolai** (1996): Mogućnost proizvodnje i korišćenja goložrnog ječma. *Žito-hleb* 23: 50-53.
- Pržulj, N., V. Momčilović, N. Mladenov i V. Đurić** (1996): Golozrni ječam u uslovima Panonske nizije. *Zb. rad. Eko-konferencije 2000*, 27-30. septembar 2000, Ekološki pokret grada Novog Sada, Novi Sad, Srbija, str. 299-304.
- Takahashi, R.** (1955): The origin and evolution of cultivated barley. *Adv. Genet.* 7: 227-266.
- Taketa, S., S. Kikuchi, T. Awayama, S. Yamamoto, M. Ichii** and **S. Kawasaki** (2004): Monophyletic origin of naked barley inferred from molecular analyses of a marker closely linked to the naked caryopsis gene (*nud*). *Theor. Appl. Genet.* **108** (7): 1236-1242.
- Washington, J.M., A. Box** and **A.R. Barr** (2000): Developing waxy barley cultivars for food, feed and malt. Book of Proceedings of the 8th International Barley Genetics Symposium, October 22-27, 2000, University of Adelaide, SA, Australia, pp. 303-306.
- www.sorte.minpolj.sr.gov.yu** (2006-2007): Registar priznatih sorti, objavljuje Odeljenje za priznavanje i zaštitu sorti poljoprivrednog bilja, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, Beograd.
- Zohary, D. and M. Hopf** (1993): Domestication of Plants in the Old World. The Origin and Spread of Cultivated Plants in West Asia, Europe and the Nile Valley, ed. Claderon Press, Oxford, U.K.

Primljeno: 17.10.2007.

Odobreno: 13.12.2007.

* * *

Agronomic Traits of Naked Barley in Comparison with Covered Barley

- Original scientific paper -

Dejan DODIG¹, Saša STANKOVIĆ², Miroslava JOVIĆ²,
Bojana DIMITRIJEVIĆ³ and Gordana BRANKOVIĆ³

¹Maize Research Institute Zemun Polje, Belgrade

²Center for Agricultural and Technological Research, Zaječar

³Institute of Field Crop Science, Faculty of Agriculture, Belgrade

S u m m a r y

In recent times the interest in the use of naked barley in direct human consumption and industrial processing has been increased. This is, first of all, based on the fact that naked barley presents a rich source of nutritive plant fibres and that it is not necessary to remove hull mechanically. Naked barley cultivation had not been tradition in Serbia, and therefore naked barley breeding programmes have been implemented in our institutes since 1990s. Tested germplasm originating from Asia, Africa and America was introduced, crosses were performed and first inbreds and varieties of naked barley were derived. This paper presents some agronomic traits of introduced naked barley germplasm from the International Centre for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA) and domestic naked barley lines of a recent development in comparison with covered barley varieties under agroecological conditions of eastern Serbia.

Received: 17/10/2007

Accepted: 13/12/2007

Adresa autora:

Dejan DODIG

Institut za kukuruz "Zemun Polje"

Slobodana Bajića 1

11185 Beograd-Zemun

Srbija

E-mail: ddodig@mrizp.co.yu